



JESENNÁ
PONUKA DO

REPKY A OBILNÍN

...s nami to ide ľahšie.

2022

Agro

TECHNOLÓGIA JESENNÉHO OŠETRENIA REPKY

HERBICÍDNE OŠETRENIE

Pri herbicídnom ošetrovaní repky sú najúčinnnejšie a najviac používané preemergentné herbicídy, ktoré pre dobrý účinok potrebujú kvalitne pripravenú pôdu bez hrúd a dostatok vlhky. Pri predpoklade optimálneho priebehu počasie a dostatku zrážok je to najefektívnejšie ošetrovanie, ktorým zničíme aj ťažko ničiteľné buriny už v skorých rastových fázach, čo má pozitívny vplyv na následný vývoj repky. Odporúčame nasledovné varianty herbicídneho ošetrovania:

1. **BUTISAN 400 SC (metazachlor 400 g/l) + CLOMATE (clomazone 360 g/l)**

Kombinácia týchto prípravkov rieši celé spektrum dvojkľúčolistových burín, jednoročných tráv, výmrvu obilnín v repke, vrátane problémových burín ako sú: lipkavec, rumany, kapsička pastierska, mrlíky, hviezdice, mak vlčí a iné. Výhodou tejto aplikácie je dlhý pôdny účinok. Aplikáciu sa odporúča vykonať preemergentne, do troch dní po zasiatí repky na dobre pripravenú pôdu bez hrúd. V prípade hrudovitej alebo suchej pôdy odporúčame pridať do kombinácie zmáčadlo resp. pôdny fixátor pre pôdne herbicídy **PREFIN**, ktoré zlepšuje priľnavosť aplikáčnej kvapaliny a umožňuje vytvorenie postrekového filmu v pôdnej zóne, odkiaľ kľíči väčšina burín. Dávkovanie: **BUTISAN 400 SC** 1,5 l/ha + **CLOMATE** 0,2 l/ha.

2. **BUTISAN 400 SC (metazachlor 400 g/l)**

Sólo aplikácia prípravku **BUTISAN 400 SC** v dávke 2,0 – 2,5 l/ha sa odporúča na pozemky, kde nie je problém s lipkavcom obvyčajným. Aplikáciu je výhodné vykonať preemergentne alebo skoro-postemergentne na práve vzhádzajúce buriny v kľúčnych listoch. Takáto aplikácia sa vyznačuje dlhým pôdnym účinkom a je riešením aj tam, kde ste nestihli do 3 dní vyaplikovať kombináciu **BUTISAN 400 SC + CLOMATE**.

3. **RAPSAN PLUS (metazachlor 333 g/l + quinmerac 83 g/l)**

RAPSAN PLUS je určený na ničenie dvojkľúčolistových burín, vrátane lipkavca a jednoročných tráv. Aplikácia sa môže vykonať ako preemergentne, tak aj skoro postemergentne na práve vzhádzajúce buriny, maximálne však do fázy pravých listov burín. Vyznačuje sa dlhou pôdnou účinnosťou a tak porasty repky ostávajú nezaburinené.

GRAMINICÍDNE OŠETRENIE

V prípade veľkého výskytu jednoročných trávovitých burín a výmrvu obilnín odporúčame aplikáciu graminicídu **ALIGRAM** (propanilazop 100 g/l) v dávke 0,5 l/ha od štádia 2 – 3 listov trávovitých burín, až po dávku 0,8 l/ha na konci odnožovania. Pri výskyte pýry plazivého a taktiež na prerastené trávovité buriny odporúčame použiť dávku 1,2 – 1,5 l/ha v závislosti od rastovej fázy buriny. **ALIGRAM** odporúčame aplikovať samostatne v dávke vody 200 l/ha s odstupom minimálne 3 dní od iného herbicídu.

FUNGICÍDNE A MORFOREGULAČNÉ OŠETRENIE

Úroda repky sa formuje už na jeseň. To ako repka prezimuje, závisí aj na fungicídnom a morforegulačnom zásahu. Čím bude viac zakorenená so spomaleným rastom nadzemnej časti, tým lepšie prezimuje a naštartuje na jar. Počas jesenného rastu sú porasty repky často napádané fómovou hnilobou, preto považujeme za nevyhnutné ošetriť ich fungicídmi. Nakoľko majú repky na jeseň tendenciu prerastania, aby sme tomu zamedzili a podporili zakoreňovanie, odporúčame použiť fungicíd s morforegulačným účinkom napr. **STARPRO 430 SC** (tebuconazole 430 g/l) alebo **ASPIRE** (metconazole 60 g/l). V prípade vyhladky dlhej teplej jesene alebo neskoršej aplikácie odporúčame k fungicídmi pridať regulátor rastu **AMCEL** (chlormequat chlorid 750 g/l) v nasledovných dávkach a kombináciách:

Dlhá, teplá jeseň, skorá sejba: v tomto prípade odporúčame voliť delenú aplikáciu:

1. aplikácia vo fáze 3 – 5 listov repky: **AMCEL** 1 l/ha
2. aplikácia do 14 dní od prvej aplikácii: **AMCEL** 1 l/ha + **STARPRO 430 SC** 0,6 l/ha alebo **AMCEL** 1 l/ha + **ASPIRE** 0,75 l/ha

Chladná jeseň, neskoršia sejba:

pri chladnej jeseni, kedy repky nemajú taký intenzívny rast, postačuje jedna aplikácia vo fáze 6 – 8 listov repky v dávkach: 0,6 l/ha **STARPRO 430 SC** + 1,5 l/ha **AMCEL**.

Pri takto zvolenom fungicídnom a regulačnom zásahu sa nemusíme báť o zdravotný stav repiek ani o ich možné prerastanie.

INSEKTICÍDNE OŠETRENIE A VÝŽIVA

Už pri vzhádzaní repky napádajú kľúčne listy skočky, kvôli ktorým nám môže repka doslova „miznúť pred očami“. Hneď pri objavení sa väčšieho množstva skočiek je potrebný insekticídny zásah. Ten postačuje vykonať pyretroidom **BEETLON** (lambda-cyhalothrin 50 g/l) v dávke 0,1 l/ha. V neskoršom období môže repku napádať piliarka repková alebo siatica oziminová, na ktoré je spoľahlivo účinný **CYTHRIN MAX** (cypermethrin 500 g/l) v dávke 0,05 l/ha. Treba si však uvedomiť, že oba insekticídy sú zo skupiny pyretroidov a tak pôsobia ako kontaktný a požerový jed a pre spoľahlivý účinok musí byť škodca priamo zasiahnutý postrekovou kvapalinou.

Aby sme podporili koreňový systém repky, predišli vzniku hnilôb, plesní a prasklín na koreni, odporúčame do postrekov pridať **MIKROVIT BÓR** (bór 150 g/l) v dávke 1 – 2 l/ha. Bór výrazne vplyva na lepšie vyzrievanie rastlinných pletív, lepšie prezimovanie a v neposlednom rade podporuje u rastlín príjem fosforu z pôdy.

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
AM REPKA I.	BUTISAN 400 SC CLOMATE	15 l 2 l	1,5 l 0,2 l	10 ha	635,49 €
RAPSAN 400 SC + CLOMATE	RAPSAN 400 SC CLOMATE	15 l 2 l	1,5 l 0,2 l	10 ha	603,17 €



BUTISAN 400 SC (metazachlor 400 g/l)

- preemergentný a postemergentný herbicíd do repky
- ničí dvojkľúčolistové buriny, jednoročné trávky a výmrav obilnín
- aplikácia do troch dní po zasiatí repky, alebo po vzídení, keď sú buriny maximálne v kľúčnych listoch
- dlhá reziduálna účinnosť

CLOMATE (clomazone 360 g/l)

- preemergentný herbicíd do repky
- ničí dvojkľúčolistové buriny vrátane lipkavca obyčajného, kapsičky pastierskej, hviezdice prostrednej a mrlíka bieleho
- aplikácia do troch dní po zasiatí na pôdu bez hrúd

NAŠE ODPORÚČANIE:

- TM kombinácia: BUTISAN 400 SC 1,5 l/ha + CLOMATE 0,2 l/ha do troch dní po zasiatí
- delená aplikácia: CLOMATE aplikujte preemergentne do troch dní po sejbe a BUTISAN 400 SC následne v štádiu kľúčnych listov burín



ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
AM REPKA I. PLUS	BUTISAN 400 SC	15l	1,5l	10 ha	751,32 €
	CLOMATE	2l	0,2l		
	CYTHRIN MAX	0,5l	0,05l		
	PREFIN	1l	0,1l		
RAPSAN 400 SC + CLOMATE PLUS	RAPSAN 400 SC	15l	1,5l	10 ha	719,00 €
	CLOMATE	2l	0,2l		
	CYTHRIN MAX	0,5l	0,05l		
	PREFIN	1l	0,1l		



BUTISAN 400 SC (metazachlor 400 g/l)

- preemergentný a postemergentný herbicíd do repky
- ničí dvojklíčnolistové buriny, jednoročné trávky a výmrvy obilnín
- aplikácia do troch dní po zasiatí repky, alebo po vzídení, keď sú buriny maximálne v kľúčnych listoch
- dlhá reziduálna účinnosť

CLOMATE (clomazone 360 g/l)

- preemergentný herbicíd do repky
- ničí dvojklíčnolistové buriny vrátane lipkavca obyčajného, kapsičky pastierskej, hviezdice prostrednej a mrlíka bieleho
- aplikácia do troch dní po zasiatí na pôdu bez hrúd

PREFIN (polyether-polydinethylsiloxan-copolymer 47,5 %)

- neiónové zmáčadlo pre pôdne herbicídy
- zabezpečuje rovnomerné pokrytie ošetrovaného povrchu
- zlepšuje pokrývnosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny, čím sa zvyšuje aj odolnosť proti dažďu
- vhodné aplikovať s herbicídmi, keď príprava pôdy nebola ideálna a pozemok je hrudovitý

CYTHRIN MAX (cypermethrin 500 g/l)

- insekticíd zo skupiny pyretroidov na ochranu repky pred skočkami, piliarkou repkovou a prenášačmi viróz
- silný a rýchly kontaktný účinok
- možnosť aplikácie až 2 krát počas sezóny aj v TM s herbicídmi, fungicídmi a regulátormi rastu

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
AM REPKA II.	ALIGRAM STARPRO 430 SC MIKROVIT BÓR	25 l 30 l 100 l	0,5 l 0,6 l 2,0 l	50 ha	3 010,35 €



ALIGRAM (propaquizafop 100 g/l)

- gramínicíd na trávovité buriny a výmrv obilnín v repke
- aplikujte od 2. listu trávovitých burín až do konca odnožovania
- dávka: 0,5 l/ha, v prípade zaburinenia pozemku pýrom plazivým je pýrohubná dávka 1,2 – 1,5 l/ha

STARPRO 430 SC (tebuconazole 430 g/l)

- fungicíd s morforegulačným účinkom do repky
- pôsobí na fómovú a bielu hnilobu
- má rastovo – regulačný účinok, ktorý podporuje dobré zakorenenie a vetvenie repky, obmedzuje vybiehanie rastlín
- zvyšuje odolnosť repky proti vymrznutiu
- dávka: 0,6 l/ha

MIKROVIT BÓR (bór 150 g/l)

- jesenná aplikácia zvyšuje mrazuvzdornosť a zlepšuje prezimovanie porastov
- prevencia pred vznikom hnilôb, plesní a prasklín na koreni
- dostatok bóru podporuje príjem fosforu v rastline a napomáha k lepšiemu využitiu vápnika
- dávka: 2 l/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- aplikáciu prípravku STARPRO 430 SC je možné spojiť s aplikáciou MIKROVIT BÓR v optimálnej fáze repky 4 – 6 listov
- ALIGRAM aplikujte samostatne v dávke vody minimálne 200 l/ha



ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
AM REPKA III.	ASPIRE AMCEL	15 l 40 l	0,75 l 2,0 l	20 ha	788,43 €



ASPIRE (metconazole 60 g/l)

- fungicíd s čiastočným morforegulačným účinkom
- pôsobí na fómovú aj bielu hnilobu a čerň repkovú
- jesenná aplikácia zlepšuje zdravotný stav a znižuje vymŕžanie porastov
- dávka: 0,75 l/ha v prípade kombinácie s prípravkom AMCEL

AMCEL (chlormequat chlorid 750 g/l)

- regulátor rastu, zvyšuje zimuvzdornosť
- zabraňuje predlžovaniu buniek, čím skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny
- podporuje vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov
- aplikácia v repke vo fáze 4 – 6 pravých listov, podľa stavu porastu v dávke 2 l/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- aplikáciu ASPIRE + AMCEL odporúčame vykonať vo fáze repky 4 - 6 listov v dávke ASPIRE 0,75 l/ha + AMCEL 2 l/ha na reguláciu porastov, podporenie koreňového systému repky a posilnenie obranyschopnosti porastov repky pred vznikom fómovej hniloby



ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
AM REPKA IV.	STARPRO 430 SC	30 l	0,6 l	50 ha	2 383,10 €
	AMCEL	100 l	2,0 l		
	MIKROVIT BÓR	100 l	2,0 l		



STARPRO 430 SC (tebuconazole 430 g/l)

- fungicíd s morforegulačným účinkom do repky
- pôsobí na fómovú a bielu hnilobu
- má rastovo – regulačný účinok, ktorý podporuje dobré zakorenenie a vetvenie repky, obmedzuje vybiehanie rastlín
- zvyšuje odolnosť repky proti vymrznutiu
- dávka: 0,6 l/ha

AMCEL (chlormequat chlorid 750 g/l)

- regulátor rastu, zvyšuje zimuvzdornosť
- zabraňuje predlžovaniu buniek, čím skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny
- podporuje vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov
- aplikácia v repke vo fáze 4 – 6 pravých listov, podľa stavu porastu v dávke 2 l/ha

MIKROVIT BÓR (bór 150 g/l)

- jesenná aplikácia zvyšuje mrazuvzdornosť a zlepšuje prezimovanie porastov
- prevencia pred vznikom hnilôb, plesní a prasklín na koreni
- dostatok bóru podporuje príjem fosforu v rastline a napomáha k lepšiemu využitiu vápnika
- dávka: 2 l/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- pri morforegulácii výkonných hybridov repky a dlhej teplej jeseni je vhodné skombinovať prípravok AMCEL (0,75 – 2 l/ha) s fungicídnom s morforegulačným účinkom STARPRO 430 SC (0,3 – 0,6 l/ha). Dosiahneme tým lepší vývoj koreňov s hrubším koreňovým krčkom, zamedzíme nadmernému vegetatívne rastu na jeseň a podporíme lepšie prezimovanie
- do tejto kombinácie je možné pridať MIKROVIT BÓR
- aplikáciu prípravku STARPRO 430 SC je možné spojiť s aplikáciou MIKROVIT BÓR v optimálnej fáze repky 4 – 6 listov



ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
AMCEL PACK	AMCEL CYTHRIN MAX	30 l 1,0 l	1,5 l 0,05 l	20 ha	273,61 €



AMCEL (chlormequat chlorid 750 g/l)

- regulátor rastu, zvyšuje zimuvzdornosť
- zabraňuje predlžovaniu buniek, čím skracuje a posilňuje stonku a vytvára odolnejšie rastliny
- podporuje vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov
- aplikácia v repke vo fáze 4 – 6 pravých listov, podľa stavu porastu v dávke 1,5 - 2 l/ha

CYTHRIN MAX (cypermethrin 500 g/l)

- insekticíd zo skupiny pyretroidov na ochranu repky pred skočkami, piliarkou repkovou a prenášačmi viróz
- silný a rýchly kontaktný účinok
- možnosť aplikácie až 2 krát počas sezóny aj v TM s herbicídmi, fungicídmi a regulátormi rastu
- dávka: 0,05 l/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- pri morforegulácii výkonných hybridov repky a dlhej teplej jeseni je vhodné skombinovať prípravok AMCEL (0,75 – 2 l/ha) s fungicídmi a morforegulačným účinkom STARPRO 430 SC (0,3 – 0,6 l/ha) pre ešte lepšiu reguláciu porastov



MIMORIADNA AKCIA

Za nákup každých 100 l prípravku STARPRO 430 SC (tebuconazole 430 g/l) dostanete navyše 10 l ZADARMO. Akcia platí od 1. júna 2022 do vypredania zásob.

Za nákup každých 100 l prípravku AMCEL (chlormequat chlorid 750 g/l) dostanete navyše 10 l ZADARMO

NOVINKY V PORTFÓLIU AM-AGRO

RAPSAN PLUS (metazachlor 333 g/l + quinmerac 83 g/l)

- dávka: 2 l/ha
- odporúčaná cena: 42,88 €/l

RAPSAN 400 SC (metazachlor 400 g/l)

- dávka: 1,5 l/ha v kombinácii s CLOMATE, sólo aplikácia 2,0 - 2,5 l/ha
- odporúčaná cena: 28,09 €/l





BEETLON®

svetlostabilný pyretroid s okamžitým účinkom

Účinná látka **Lambda-cyhalothrin** 50 g/l

Charakteristika

Postrekový, pyretroidný insekticídny prípravok vo forme emulgovateľného koncentrátu, určený na ochranu poľnohospodárskych plodín proti cicavým a žravým škodcom.

Vlastnosti a výhody použitia

- svetlostabilný pyretroid s veľmi rýchlym účinkom
- razantný na motýle, chrobáky a cicavý hmyz
- vhodný k striedaniu insekticídov proti vzniku rezistentných populácií škodcov (napr. s ACEPTIR 200 SE, DACOR alebo CYTHRIN MAX)

Jesenná registrácia

Plodina	Účel použitia	Dávka l/ha	Ochranná doba	Počet aplikácií
pšenica ozimná	vošky, pestrička pšeničná	0.1	AT	max. 4x
repka ozimná	skočka repková	0.15	AT	max. 3x

Pôsobenie

Prípravok BEETLON na báze účinnej látky lambda - cyhalothrin patrí do skupiny syntetických pyrethroidov. Hmyz usmrčuje ako dotykový a požerový jed. Veľmi dobrý účinok má na hmyz z rodov: motýle, chrobáky a rovnokrídlavce. Predpokladom dosiahnutia dobrého účinku, je dobré pokrytie rastliny postrekovou kvapalinou. Na zabezpečenie maximálnej a dlhotrvajúcej účinnosti na minimalizovanie pravdepodobnosti rozvoja rezistentných druhov škodcov, odporúčame zaviesť do pravidelných ročných postrekových programov nepyretroidný insekticíd.

PREČO MÁ JESENNÉ OŠETRENIE OBILNÍN VÝZNAM?

Porasty ozimných obilnín je najvhodnejšie ošetriť v jesennom období. Je to z dôvodu, že buriny nachádzajúce sa v oziminách sú schopné významne konkurovať zasiatej plodine odoberaním veľkého množstva živín a vlhky. Tým môžu výrazne obmedziť podmienky pre odnožovanie oziminy. Je dokázané, že jesenné buriny dokážu odčerpať ozimnej obilnine až do 40 kg dusíka z hektára.

Za posledných pár rokov sa okrem poveternostných podmienok mení aj skladba burín v ozimných obilninách a čoraz viac sa objavujú buriny vzhádzajúce na jeseň. Ako prvé začínajú vzhádzať buriny typu T1: hviezdica, veronika, fialka, pastierska kapsička, úhorník liečivý a iné. Ďalšie buriny typu T2 vzhádzajúce od jesene do jari, ktoré majú menší nárok na teplotu klíčenia sú: mak vlčí, rumany, rumančeky, lipkavec, metlička obyčajná, ostrôžka poľná, atď.

Všetky vymenované buriny je najefektívnejšie ošetrovať v jesennom období, aby nemali podmienky rozširovať sa a potláčať tak vývoj zasiatej obilniny. Jesenná herbicídna aplikácia menej stresuje obilninu a eliminujeme riziko prerastenia burín, ktoré môže byť problematické v jarnom období. Tým, že oziminy ošetríme na jeseň, zabránime vysemeneniu vyššie spomenutých burín, ako napr. úhorník liečivý či metlička obyčajná, ktorých regulácia je vážnym problémom aj v následnej plodine, napr. v repke. Výhodou jesenného ošetrovania je aj jednoduchšie ničenie veroniky a hviezdice, ktoré vytvárajú „koberec“, čím brzdia rast a vývoj obilniny.

Jesenné ošetrovanie obilnín má svoj význam:

- najviac burín je najcitlivejších na herbicídy na jeseň
- agronomicky správne riešenie všade tam, kde sa vyskytuje metlička a iné trávovité buriny
- buriny typu T1 a T2 vzhádzajú súčasne so zasiatou plodinou a tej konkurujú o živiny, priestor, o vodu a svetlo
- ozimné obilniny sú najcitlivejšie na zaburinenie od vzhádzania až do odnožovania
- likvidácia konkurenčných burín na jeseň znamená nerušený vývoj kultúrnej plodiny
- vrchol jarých prác nám nezatažujú herbicídne ošetrovania obilnín
- jesenné ošetrovanie burín zabráni odberu živín burinami v skorej jari
- jesenným ošetrovaním sa vyhneme prerasteniu burín v jarnom období

Čím ošetrovať porasty ozimných obilnín?

1. AM APERA PACK (AGILITY + PENDICOL)

Herbicídny balíček na 40 ha je určený ako silný „protimetličkový zásah“ s dlhým pôdnym účinkom. Ideálne je použitie balíčka na plochách s výskytom metličky, ďalších trávovitých burín ako aj jednoročných dvojklíčnolistových burín. Aplikácia sa odporúča preemergentne alebo skoro postemergentne do fázy 1 – 2 listov metličky a 1. páru pravých listov dvojklíčnolistových burín.

2. AGILITY (chlorotoluron 500 g/l a diflufenican 100 g/l)

Herbicíd na ničenie metličky obyčajnej a dvojklíčnolistových burín v obilninách. Účinná látka chlorotoluron je absorbovaná koreňmi a listami rastlín, kde blokuje fotosyntézu. Diflufenican je prijímaný najmä mladými rastlinami v období klíčenia, pri E-POST aplikácii je absorbovaný listami. Citlivé buriny vyklíčia, ale rýchlo zožltnú, postupne nekrotizujú a nakoniec odumierajú.

Odporúčania na správnu aplikáciu AGILITY v ozimných obilninách:

Dávka 1 l/ha – ak sa aplikuje na ľahkých piesočnatých pôdach, v štádiu 1 – 3 listov obilnín, v TM kombináciách s partnerom (ako v prípade AM APERA pack), a ak buriny – najmä metlička nie je vo vyvinutejšom štádiu ako 1 list.

Dávka 1,25 l/ha – na stredne ťažkých pôdach s dostatočným obsahom humusu pri E-Post aplikácii v štádiu 3 – 5 listov obilnín, keď má metlička 1-2 listy, môže sa aplikovať v tejto dávke aj sólo, pokiaľ nie sú trávny vo vyvinutejšom štádiu a nie je silný tlak lipkavca. Vyššia dávka by nemala byť použitá v ozimnom jačmeni, raži a tritikale, keďže tieto obilniny sú z hľadiska tolerance na ú.l. citlivejšie a takisto ani pri neskorých sejbách.

Dávka 1,25 – 1,5 l/ha – buď pri preemergentnej aplikácii, alebo na hlbokých humózných pôdach v nivách riek, kde je silný tlak prerastených burín, metlička má 3 listy, pozemok je zaburinený aj lipkavcom a pri neskoršej aplikácii na dobre vyvinutý porast obilniny v plnom odnožovaní.

V PRÍPADE SILNÉHO VÝSKYTU **VÝDROLU REPKY** V OBI LNINE ODPO RÚ ČAME DO KOMBINÁCIE K **AGILITY** PRIDA Ť PRÍPRAVOK **SAVVY** (metsulfuron methyl 200 g/kg) v dávke 20 g/ha – túto herbicídnu kombináciu nájdete v cenovo zvýhodnenom balíku AGILITY + SAVVY.

3. DINA + FENCE (diflufenican 500 g/l + flufenacet 480 g/l)

Herbicídna kombinácia s dlhým pôdnym reziduálnym účinkom je určená na PRE a skoro POST-emergentné ošetrovanie na ešte nevzrástajúce buriny alebo buriny maximálne v štádiu klíčnych listov. Kombinácia sa odporúča na pozemky kvalitne pripravené na sebu s dobrou štruktúrou a s prevládajúcimi trávovitými burinami (metlička obyčajná, lipnica ročná, psiarka roľná)

4. DINA + SAVVY JESE Ň (diflufenican 500 g/l + metsulfuron methyl 200 g/kg)

Balíček obsahuje prípravky SAVVY a DINA 500 SC. Je účinným a ekonomicky výhodným riešením pre porasty ozimných obilnín proti dvojklíčnolistovým burinám všade tam, kde nie je očakávaný výskyt metličky, psiarky a iných trávovitých burín. Herbicídna kombinácia sa vyznačuje aj pôdnym účinkom.

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
AM APERA PACK	AGILITY PENDICOL 33 EC	40l 60l	1,0l 1,5l	40 ha	2 108,58 €



AGILITY (chlorotoluron 500 g/l + diflufenican 100 g/l)

- herbicíd na ničenie metlíčky a dvojklíčnolistových burín
- možnosť preemergentnej aj postemergentnej aplikácie
- ničí fialky, hluchavky, hviezdice, kapsičku, pakosty, rumany, veroniky, výmrav repky, metličku, psiarku a iné
- aplikácia v štádiu 1-4 listov obilniny, dvojklíčnolistové buriny do fázy 2 pravých listov, metlička do štádia 1-2 listov
- dlhá reziduálna účinnosť až 8 týždňov
- dávka: 1,25 - 1,5 l/ha

PENDICOL 33 EC (pendimethalin 330 g/l)

- preemergentný a skoro-postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín
- aplikácia na dobre pripravenú pôdu, bez hrúd v TM s prípravkom AGILITY
- dávka: 1,5 l/ha (v kombinácii s AGILITY)

NAŠE ODPORÚČANIE:

- AGILITY 1,0 l/ha + PENDICOL 33 EC 1,5 l/ha môžete aplikovať na jeseň postemergentne v štádiu 1 - 4 listov obilniny (BBCH 11 - 13) v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale
- najlepšie výsledky dosiahnete v skorých rastových fázach burín



ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
AGILITY + SAVVY	AGILITY SAVVY	40 l 800 g	1,0 l 20,0 g	40 ha	1 436,73 €



AGILITY (chlorotoluron 500 g/l + diflufenican 100 g/l)

- herbicíd na ničenie metličky a dvojkličnolistových burín
- možnosť preemergentnej aj postemergentnej aplikácie
- ničí fialky, hluchavky, hviezdice, kapsičku, pakosty, rumany, veroniky, výmrvi repky, metličku, psiarku a iné
- aplikácia v štádiu 1-4 listov obilniny, dvojkličnolistové buriny do fázy 2 pravých listov, metlička do štádia 1-2 listov
- dlhá reziduálna účinnosť až 8 týždňov
- dávka: 1,25 - 1,5 l/ha

SAVVY (metsulfuron methyl 200 g/kg)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojkličnolistových burín
- ničí kompletne spektrum dvojkličnolistových burín
- vynikajúca účinnosť na rumančekovité a kapustovité buriny
- excelentné ničenie výdroľu repky
- dávka: 20 g/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- AGILITY 1,25 - 1,5 l/ha môžete aplikovať na jeseň postemergentne v štádiu 1 - 4 listov obilniny (BBCH 11 - 13) v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, raži a tritikale
- najlepšie výsledky dosiahnete v skorých rastových fázach burín



AGILITY

HERBICÍD

Účinné látky: chlorotholuron 500 g/l + diflufenican 100 g/l

Čisté porasty už na jeseň

**ÚČINNÁ KONTROLA METLIČKY
A DVOJKLÍČNOLISTOVÝCH BURÍN
V OZIMNÝCH OBILNINÁCH**

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
DINA + FENCE	DINA 500 SC FENCE	5 l 10 l	0,15 l 0,30 l	33,3 ha	1 147,42 €



DINA 500 SC (diflufenican 500 g/l)

- PRE a POST-emergentný herbicíd proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v ozimných obilninách
- kontaktný herbicíd s pôdnym reziduálnym účinkom až do 8 týždňov
- ničí fialky, hviezdice, veroniky, stavikrv a iné
- aplikácia od 1. listu obilniny
- dávka: 0,15 l/ha

FENCE (flufenacet 480 g/l)

- PRE a skoro POST-emergentný herbicíd proti jednoročným trávam
- ničí široké spektrum trávovitých burín - metlička obyčajná, lipnica ročná, psiarka roľná
- najúčinnnejšia aplikácia je preemergentne - na ešte nevzídene buriny
- dávka: 0,3 l/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- kombinácia DINA 500 SC + FENCE je určená na pozemky s prevládajúcimi trávovitými burinami, spoľahlivo účinkuje aj na dvojklíčnolistové buriny (zemedym, hluchavky, parmanček, stavikrv, pohánkovec, peniažtek, veroniky, fialky, a iné),
- aplikácia sa odporúča PRE alebo skoro POST-emergentne na ešte nevzídene buriny, prípadne na buriny v skorých vývojových štádiách, v porastoch pšenice ozimnej a jačmeni ozimnom



ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORÚČANÁ CENA
DINA + SAVVY JESEŇ	DINA 500 SC SAVVY	6 l 1200 g	0,15 l 30,0 g	40 ha	822,69 €



DINA 500 SC (diflufenican 500 g/l)

- postemergentný herbicíd proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v ozimných obilninách
- kontaktný herbicíd s pôdnym reziduálnym účinkom až do 8 týždňov
- ničí fialky, hviezdice, veroniky, stavikrv a iné
- aplikácia od 1. listu obilniny
- dávka: 0,15 l/ha

SAVVY (metsulfuron methyl 200 g/kg)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- ničí kompletne spektrum dvojklíčnolistových burín
- vynikajúca účinnosť na rumančekovité a kapustovité buriny
- dávka: 30 g/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- kombinácia DINA 500 SC + SAVVY je určená na pozemky, na ktorých prevládajú buriny spodného poschodia
- aplikácia je vhodná v porastoch pšenice ozimnej, jačmeni ozimnom, raže a ritikale
- najlepšie výsledky dosiahnete v skorých rastových fázach burín





JESENNÉ BALÍKY DO REPKY - 2022

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PŘÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORUČANÁ CENA	
AM REPKA I.	BUTISAN 400 SC CLOMATE	15 l 2 l	1,5 l 0,2 l	10 ha	639,49 €	
RAPSAN 400 SC + CLOMATE	RAPSAN 400 SC CLOMATE	15 l 2 l	1,5 l 0,2 l	10 ha	603,17 €	
AM REPKA I. PLUS	BUTISAN 400 SC CLOMATE CYTHRIN MAX PREFIN	15 l 2 l 0,5 l 1 l	1,5 l 0,2 l 0,05 l 0,1 l	10 ha	751,32 €	
RAPSAN 400 SC + CLOMATE PLUS	RAPSAN 400 SC CLOMATE CYTHRIN MAX PREFIN	15 l 2 l 0,5 l 1 l	1,5 l 0,2 l 0,05 l 0,1 l	10 ha	719,00 €	
AM REPKA II.	STARPRO 430 SC ALIGRAM MIKROVIT BŮR	30 l 25 l 100 l	0,6 l 0,5 l 2,0 l	50 ha	3 010,35 €	
AM REPKA III.	ASPIRE AMCEL	15 l 40 l	0,75 l 2,0 l	20 ha	788,43 €	
AM REPKA IV.	STARPRO 430 SC AMCEL MIKROVIT BŮR	30 l 100 l 100 l	0,6 l 2,0 l 2,0 l	50 ha	2 383,10 €	
AMCEL PACK	AMCEL CYTHRIN MAX	30 l 1,0 l	1,5 l 0,05 l	20 ha	273,61 €	

JESENNÉ BALÍKY DO OBLNÍN - 2022

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PŘÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	ODPORUČANÁ CENA	
AM APERA PACK	AGILITY PENDICOL 33 EC	40 l 60 l	1,0 l 1,5 l	40 ha	2 108,58 €	
AGILITY + SAVVY	AGILITY SAVVY	40 l 800 g	1,0 l 20 g	40 ha	1 436,73 €	
DINA + FENCE	DINA 500 SC FENCE	5 l 10 l	0,15 l 0,30 l	33,3 ha	1 147,42 €	
DINA + SAVVY JESEŇ	DINA 500 SC SAVVY	6 l 1200 g	0,15 l 30 g	40 ha	822,69 €	



AM - AGRO s.r.o.

Murgašova 38/2, 949 01 Nitra




info@am-agro.com



www.am-agro.com

- Sklad **SENICA**
- Sklad **HLINÍK NAD HRONOM**
- Sklad **PREŠOV**



📍 **Ing. Martin Mráz** - konateľ

☎ +421 918 614 037

✉ martin.mraz@am-agro.com

📍 **Ing. Gabriel Villár** - obchodný riaditeľ

☎ +421 905 474 411

✉ gabriel.villar@am-agro.com

📍 **Ing. Daniela Vargová** - obchodný zástupca

☎ +421 918 614 052

✉ daniela.vargova@am-agro.com

📍 **Ing. Róbert Čík** - obchodný zástupca

☎ +421 918 614 049

✉ robert.cik@am-agro.com

📍 **Ing. Eva Habalová** - obch. zástupca, marketing

☎ +421 918 614 034

✉ eva.habalova@am-agro.com

📍 **Ing. Marika Hamzová** - obch. zástupca, registrácie

☎ +421 918 614 047

✉ marika.hamzova@am-agro.com

📍 **Attila Morovics** - obchodný zástupca

☎ +421 918 614 033

✉ attila.morovics@am-agro.com

📍 **Pali Svoren** - obchodný zástupca

☎ +421 915 378 591

✉ pali.svoren@am-agro.com

📍 **Ing. Stanislava Veličková, PhD.** - obchodný zástupca

☎ +421 918 670 006

✉ stanislava.velickova@am-agro.com

📍 **Ing. Ladislav Sabo** - obchodný zástupca

☎ +421 918 688 333

✉ ladislav.sabo@am-agro.com

📍 **Ing. Dušan Blaho** - obchodný zástupca

☎ +421 918 398 803

✉ dusan.blaho@am-agro.com