

REPNÉ AKTUALITY

Vážení kolegovia repári,

Priebeh aktuálneho počasia je ideálny pre rozvoj patogénu *Cercospora beticola*. Považujeme preto za veľmi dôležité, skrátiť interval medzi prvou a druhou fungicídnu aplikáciou na maximálne 10 dní.

Súčasťou všetkých fungicídnych aplikácií by mal byť prípravok obsahujúci meď!

Dôvodov na jeho použitie je hneď niekoľko:

1. Zabránim vznik rezistencie
2. Aplikáciou dosiahneme okamžitý stop efekt na ďalší rozvoj patogéna
3. Meď v tankmixe s účinnými látkami fungicídov zabezpečí synergický efekt aplikácie.

Veľká listová plocha cukrovej repy vyžaduje dostatočné množstvo postrekovej kvapaliny (250-400 l vody). Účinnosť aplikácie môžeme zvýšiť použitím vhodných adjuvantov. Tu treba zdôrazniť nutnosť konzultácie s poradenským servisom AM-AGRO alebo agronomickou službou cukrovarov. Každý adjuvant sa totiž vyznačuje špecifickými vlastnosťami a pri jeho nesprávnom použití (dávovaní) môže spôsobiť fytotoxicitu. Vhodnou súčasťou uvedených aplikácií sú tiež listové hnojivá so zvýšeným obsahom draslíka.

Spoločnosť AM-AGRO vám ponúka tieto riešenia:

BAGANI 0,8 l/ha (tetraconazole) + **CUPROMIX** 1,5 l/ha (hydroxid meďnatý)

KALPRIM 2,0 l/ha (draslík 400 g/l , dusík 44 g/l)

TYTANIT 0,2 l/ha (horčík 63 g/l, síra 126 g/l, titán 8,5 g/l)

Ďakujeme za spoluprácu.

Tím spoločnosti AM-AGRO

