

The logo for AMagro, featuring the letters 'AM' in a stylized, bold font followed by 'agro' in a lowercase sans-serif font. The background of the entire page is a faded image of a green tractor in a field of leafy plants.

AMagro

Váš poradenský servis

GRANDO

ÚČINNÁ LÁTKA: *triflusulfuron-methyl 500 g/kg*

The logo for AMagro, featuring the letters 'AM' in a stylized, bold font followed by 'agro' in a lowercase sans-serif font.

AMagro

Váš poradenský servis

GRANDO



- ❑ herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom určený na postemergentnú aplikáciu
- ❑ prijímaný je predovšetkým listami rastlín, príjem koreňmi je obmedzený na niekoľko dní po aplikácii
- ❑ príznaky poškodenia burín (chloróza, nekróza) sú viditeľné až po niekoľkých dňoch po aplikácii
- ❑ teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporujú účinok prípravku, chladné a suché počasie účinok oneskoruje

CITLIVÉ BURINY

láskavec ohnutý	podslnečník Theofrastov
horčiak obyčajný	lipkavec obyčajný
bažanka ročná	ľuľok čierny
pichliač obyčajný (len zo semena!)	konopnica napuchnutá
výmrv repky	výmrv slnečnice
tetucha kozia	rumančekovité buriny
rumany	žltica maloúborová
mlieč roľný	horčica roľná
red'kev ohnicová	peniažtek roľný
veroniky	kapsička pastierska
nevädza poľná	hluchavky
starček obyčajný	mak vlčí



NÁVOD NA POUŽITIE

repa cukrová repa krmna	jednoročné dvojkľúčolistové buriny	30 g/ha
----------------------------	---------------------------------------	---------

Maximálny počet ošetrení: 4x30 g/ha za rok = 120 g/ha

V prepočte na účinnú látku max 60 g/ha za rok

GRANDO aplikujte **VŽDY** s použitím vhodného zmáčadla!

MOŽNOSTI POUŽITIA ADJUVANTOV

GRANDO 30 g/ha + TREND 90 0,25 l/ha

GRANDO 30 g/ha + SILWET STAR 0,1 - 0,2 l/ha

GRANDO 30 g/ha + TEGOPLANT SPU 0,1 - 0,2 l/ha



HERBICÍDNE KOMBINÁCIE

1. GRANDO 30 g/ha + BETASANA 3,0 l/ha

Bezpečná eliminácia na všetky bežne sa vyskytujúce buriny v cukrovej repe (mrlíky, lobody).

2. GRANDO 30 g/ha + BETTIX 700 SC 1,0 - 1,5 l/ha

Kombinácia okrem rozšírenia účinku o mrlíky a lobody výrazne predlžuje reziduálne pôsobenie aplikácie. MTM je účinná látka s kontaktným (30%), ale hlavne s pôdnym (70%) účinkom.

3. GRANDO 30 g/ha + OBLIX 0,3 - 0,4 l/ha

Špeciálna kombinácia na porasty s vysokým obsahom horčiakov. ETF pôsobí v kombinácii synergicky, ovplyvňuje voskovú vrstvu – a to aj u repy cukrovej.

4. GRANDO 30 g/ha + LENA 500 SC 0,3 - 0,4 l/ha

LENA 500 SC, ako koreňový herbicíd je ideálnym partnerom k prípravku GRANDO (kombinovaný mechanizmus účinku). Kombinácia okrem rozšírenia účinku o mrlíky a lobody výrazne predlžuje reziduálne pôsobenie aplikácie.

TECHNOLÓGIA AM-AGRO CUKROVÁ REPA 2021

Produkt:	T 1 l, g/ha	T 2 l, g/ha	T 3 l, g/ha	T 4 l, g/ha
BETASANA SC	3,0	3,0		
BETTIX 700 SC	1,0	1,5		
BETTIX COMBI			1,5	
LENA 500 SC			0,2	0,4
OBLIX	0,25	0,4		
GRANDO + TEGOPLANT SPU		30 g + 0,2	30 g + 0,2	30 g + 0,2



VÝHODY POUŽITIA

- správnym použitím TSM môžeme zvýšiť rýchlosť asimilácie
- **menšie listy** – zlepšujeme pomer buľva/list, listy sa tvoria rýchlejšie
- **kratšia stopka** – listy sú vzpriamené, lepšie osvetlený porast
- **vyššia hustota chlorofylu** – zvyšuje asimiláciu (dostatočné zásobenie Mg a Fe)
- **pomalšie starnutie listov** – TSM je antagonist a auxínov = inhibuje etylén. Vysoká hladina etylénu zvyšuje respiráciu a degeneráciu chlorofylu.
- **vyšší obsah cukru** – repa tvorí o 1 - 2 kambiálne kruhynavyše

Ďakujem za pozornosť