

TECHNOLÓGIA OCHRANY KUKURICE 2021



ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/ HA	VÝMERA	CENA/HA	ODPORÚČANÁ CENA/ BALÍK
CAMIX + PREFIN	CAMIX PREFIN	100 l 2 l	2,5 l 0,05 l	40 ha	66,09 €	2643,60 €

CAMIX (*mesotrione* 60 g/l + *S-metolachlor* 500 g/l)

- preemergentný a skoro-postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných tráv a dvojkľúčolistových burín
- špecialista na kompletne spektrum jednoročných trávovitých a jednoročných dvojkľúčolistových burín vyskytujúcich sa v kukurici
- aplikácia preemergentne, alebo skoro-postemergentne s pôdnym „fixátorom“ PREFIN
- dlhý pôdny účinok
- dávka: 2,5 l/ha



PREFIN (*polyether-polydimethylsiloxan-copolymer* 47,50 %)

- neiónové zmáčadlo pre použitie s preemergentnými a skoro-postemergentnými herbicídmi
- zabezpečuje rovnomerné pokrytie ošetrovaného povrchu
- udržiava stabilný herbicídny film aj v prípade silných dažďov
- zvyšuje absorpciu účinnej látky pôdnymi časticami
- dávka: 0,05 l/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- CAMIX 2,5 l + PREFIN 0,05 l aplikujte preemergentne alebo skoro-postemergentne na dobre pripravenú pôdu bez hrúd
- herbicídna kombinácia je určená na pozemky zaburinené širokým spektrom tráv a dvojkľúčolistových burín



ZVÝHODNENÝ BALÍK	OBSAH	DÁVKA/HA	VÝMERA	CENA/HA	ODPORÚČANÁ CENA/ BALÍK
NIKITA + zmáčadlo KINETIC	15 kg + 5 l	0,6 kg + 0,2 l	25 ha	67,69 €	1692,20 €
NIKITA + zmáčadlo KINETIC	30 kg + 10 l	0,6 kg + 0,2 l	50 ha	66,24 €	3312,17 €

NIKITA (nicosulfuron 100 g/kg, mesotrione 150 g/kg, dicamba 312,5 g/kg)

- komplexný EPOST a POST herbicíd do kukurice na ničenie jednoročných, trvácich tráv a dvojklíčnolistových burín
- formulácia dispergovateľných granúl WG
- pýrohubná dávka účinnej látky nicosulfuron
- 3 odlišné a navzájom sa dopĺňajúce účinky
- excelentná rovnováha medzi účinnosťou a selektivitou
- pôdne reziduálne pôsobenie účinnej látky mesotrione
- aplikácia možná od 2. do 6. listu kukurice, v skorých rastových štádiách trávovitých burín



KINETIC (organo-silikátové zmáčadlo)

- zmáčadlo určené na zlepšenie vlastností postrekovej kvapaliny, zníženie úletu, rovnomernému pokrytiu ošetrovaného povrchu a zlepšenie biologickej účinnosti
- dokonale pokrýva a rozmáča povrch listov, vrátane silnejšej voskovej vrstvičky pri podmienkach sucha
- zabraňuje stekaniu postrekovej kvapaliny z povrchu listov, čím obmedzuje straty účinnosti

NAŠE ODPORÚČANIE:

- prípravok NIKITA aplikujte vždy so zmáčadlom KINETIC v dávke NIKITA 0,6 kg/ha + KINETIC 0,2 l/ha v 200 – 400 l vody/ha
- NIKITA je určená na pozemky zaburinené aj trvácimi trávami a dvojklíčnolistovými burinami
- aplikáciu odporúčame vykonať v skorých rastových fázach burín



ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/ HA	VÝMERA	CENA/HA	ODPORÚČANÁ CENA/ BALÍK
ZEAPACK RESIDUAL	BANDERA BARRACUDA ZEAGRAN 340 SE	20 l 20 l 20 l	1,0 l 1,0 l 1,0 l	20 ha	71,02 €	1420,30 €

BANDERA (nicosulfuron 40 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných, trvácich tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín
- špecialista na ježatky, moháre a prstovky
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- dávka: 1 l/ha

BARRACUDA (mesotrione 100 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- široké aplikačné okno PRE - E-POST – POST aplikácia
- špecialista na ambróziu, podsľnečník, mrlíky, durman, ivu,
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18) dávka: 1,0 l/ha

ZEAGRAN 340 SE (bromoxynil 90 g/l + terbuthylazine 250 g/l) - **spotreba do 17.09.2021**

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- špecialista na láskavce, pohánkovec, mrlíky, lobody, horčičky
- aplikácia od 3. listu (BBCH 13) do 6. vyvinutého listu kukurice (BBCH 15)
- dávka: 1 l/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- ZEAPACK RESIDUAL (BANDERA 1 l + BARRACUDA 1 l + ZEAGRAN 1 l) aplikujte postemergentne, od 3 do 6 listov kukurice, na pozemkoch zaburinených dominantne širokolístovými burinami v čase keď je väčšina trávovitých burín už vzídená a očakávate ešte ďalšiu vlnu vzhádzajúcich dvojklíčnolistových burín
- herbicídna kombinácia má aj pôdny účinok vďaka 2 účinným látkam – mesotrione a terbuthylazine až do uzatvorenia porastu
- odporúčame aplikovať na pozemky zaburinené predovšetkým dvojklíčnolistovými burinami s nižším zaburinením trávovitými burinami
- v prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU (neodporúčame použiť olejové zmáčadlo)



POUŽITELNÝ V CHRÁNENÝCH
VODOHOSPODÁRSKÝCH
OBLASTIACH

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/ HA	VÝMERA	CENA/HA	ODPORÚČANÁ CENA/ BALÍK
ZEAPACK TURBO	BANDERA BARRACUDA PONANT	20 l 20 l 6 kg	1,0 l 1,0 l 0,3 kg	20 ha	71,77 €	1435,53 €

BANDERA (*nicosulfuron* 40 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných a trvácich tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín
- špecialista na ježatky, moháre a prstovky
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- dávka: 1 l/ha

BARRACUDA (*mesotrione* 100 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- široké aplikačné okno PRE - E-POST – POST aplikácia
- špecialista na ambróziu, podslnečník, mrlíky, durman, ivu,
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- dávka: 1 l/ha

PONANT (*dicamba* 700 g/kg)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- špecialista na pichliač, mrlíky, láskavce, fialky a výmrsv slnečnice
- aplikácia od 3. listu (BBCH 13) do 6. vyvinutého listu kukurice (BBCH 16)
- dávka: 0,3 kg/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- ZEAPACK TURBO (BANDERA 1 l + BARRACUDA 1 l + PONANT 0,3 kg) aplikujte postemergentne, od 2 do 6 listov kukurice, keď sú buriny vzrúdené
- odporúčame aplikovať na pozemky zaburinené trávami a problematickými dvojklíčnolistovými burinami ako sú napr. pichliač, durman, rumany, ambrózia, podslnečník a iné
- veľmi rýchly a kvalitný účinok na buriny
- herbicídna kombinácia má aj pôdny účinok vďaka účinnej látke mesotrione
- v prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU



POUŽITELNÝ V CHRÁNENÝCH
VODOHOSPODÁRSKÝCH
OBLASTIACH

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/ HA	VÝMERA	CENA/HA	ODPORÚČANÁ CENA/ BALÍK
ZEAPACK COMPLETE	BANDERA BARRACUDA SULCOGAN 300 SC	20 l 15 l 20 l	1,0 l 0,75 l 1,0 l	20 ha	83,71 €	1674,13 €

BANDERA (nicosulfuron 40 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných a trvácich tráv a jednoročných dvojkl. burín
- špecialista na ježatky, moháre a prstovky
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- dávka: 1 l/ha

BARRACUDA (mesotrione 100 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- široké aplikačné okno PRE - E-POST – POST aplikácia
- špecialista na ambróziu, mrlíky, durman, podslniečnik, ivu
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- dávka: 0,75 l/ha

SULCOGAN 300 SC (sulcotrione 300 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- špecialista na podslniečnik, mrlíky, durman, silný podporný účinok aj na pichliač
- dotvára účinok nicosulfuronu na trávovité buriny vrátane prosa siateho divého
- veľmi selektívna účinná látka ku kukurici
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- dávka: 1 l/ha

NAŠE ODPORÚČANIE:

- ZEAPACK COMPLETE (BANDERA 1 l + BARRACUDA 0,75 l + SULCOGAN 1 l) aplikujte postemergentne, od 2 do 8 listov kukurice, keď sú buriny vzídené a neočakávate ďalšiu vlnu burín
- odporúčame aplikovať na pozemky, kde prevládajú jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ale aj trávy
- v prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU



POUŽITELNÝ V CHRÁNENÝCH
VODOHOSPODÁRSKÝCH
OBLASTIACH



CYTHRIN MAX (cypermethrin 500 g/l)

- insekticíd (pyretroid) určený na ochranu kukurice proti zunčavke jačmennej a víjačke kukuričnej
- zunčavka jačmenná: ošetríte najneskôr do BBCH 67 (kvitne celá metlina)
- víjačka kukuričná: ošetríte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov. Ak sa objaví vrchol, opakujte za 10 dní
- dávka: 0,05 l/ha



šúľok kukurice poškodený larvou víjačky kukuričnej



ASAHI SL (sodium p-nitrophenolate 3 g/l + sodium o-nitrophenolate 2 g/l + sodium 5-nitroquaiacolate 1 g/l)

- biostimulátor rastu a vývoja rastlín, stimulujúci rast koreňovej sústavy, násadu plodov, opelenie a dozrievanie plodov
- priamo spôsobuje vysokú kvalitu a kvantitu produkcie
- zmierňuje stresové faktory akými sú herbicídne aplikácie, alebo nedostatok vlhky
- aplikácia v štádiu BBCH 16 (6 listov kukurice) formou postreku na list
- dávka: 0,6 l/ha


MIKROVIT ZINK (zinok 112 g/l)

- tekuté listové hnojivo určené na mikrovýživu kukurice s rýchlym a riadeným uvoľňovaním živín
- prekursor auxínov - predlžuje vlhkosť blizien, podpora lepšieho ozrnenia šúľku
- zlepšenie fotosyntézy a absorpcie dusíka, draslíka a fosforu
- pôsobí antistresovo po aplikácii herbicídov
- dávka: 0,5 - 1 l/ha, od fázy 2-6 listu až po začiatok metania



Technológia AM-AGRO

kukurica



Dávkovanie je uvádzané na 1 ha.