

DLHODOBO UDRŽATEĽNÝ SPÔSOB PESTOVANIA CUKROVEJ REPY NA SLOVENSKU!

KONVENČNÁ HERBICÍDNA TECHNOLÓGIA V CUKROVEJ REPE

Konvenčná technológia tvorí v súčasnosti len menšiu časť pestovateľskej plochy na Slovensku. Napriek tomu je stále základným spôsobom herbicídnej ochrany CR. Kombináciou účinných látok s rôznym mechanizmom účinku pokryjeme celé spektrum najvýznamnejších burín v cukrovej repe. Napomáhame tým k vytváraniu antirezistentnej stratégie proti burinám v cukrovej repe.

RINPODE

NOVÝ HERBICÍD DO CUKROVEJ REPY –
POMOCNÍK PRI ANTIREZISTENTNÝCH TECHNOLÓGIÁCH

účinná látka: Florpyrauxifen-benzyl 25,05 g /l.

- RINPODE (Florpyrauxifen-benzyl) je klasifikovaný ako syntetický auxín (HRAC 4) zo skupiny arylpikolinátov.
- RINPODE ponúka odlišný spôsob pôsobenia - zasahuje a postupne paralyzuje rastové vrcholy burín.
- Výborný účinok na mrlík, podslnečník, tetuchu, durman, ambróziu a iné buriny.
- Vysoká účinnosť na problematické buriny vrátane ALS a PSII rezistentných populácii.
- Ideálny partner do TM aplikácií.
- Neaplikovať samostatne - vždy ako súčasť herbicídneho TM programu.
- Zaradenie RINPODE do TM programu prináša výrazné posilnenie účinnosti ostatných herbicídov.
- Vždy použiť delenú dávku - neaplikovať v jednej dávke.
- Aplikujte 2 až 4 krát: 2 x 0,04 l/ha, alebo 3 x 0,026 l/ha, alebo 4 x 0,02 l/ha.
- Maximálna dávka 0,08 l/ha za vegetáciu.
- Najlepšie výsledky dosiahneme pri aplikácii na mladé, aktívne rastúce buriny v štádiu 2-4 pravých listov.
- Aplikovať v delených dávkach s odstupom 5-7 dní, alebo pri objavení sa novej vlny burín.
- Neaplikovať s graminicídmi a herbicídmi s účinnou látkou clopyralid.
- Neaplikovať spoločne v TM s CONVISO ONE.
- Neošetrujte porasty pri vysokých teplotách nad 25 °C.
- Neaplikujte na mokré porasty.

Pre podrobnejšie informácie využite poradenský servis **AM-AGRO (WWW.AM-AGRO.COM)**.

HERBICÍDNE PROGRAMY CUKROVÁ REPA

AM-AGRO 2027

KONVENČNÁ TECHNOLÓGIA

počet aplikácií 5

č. apl.	prípravok	účinná látka	dávka l/ha
T0	BETTIX COMBI	Metamitron 350 g/l	2,0
		Ethofumesate 150 g/l	
	PREFIN	Polyéter-polydimethylsiloxan-copolymer 47,5 %	150 ml/ha
T1	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	2,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,0
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,2
	RINPODE	Florpyrauxifen-benzyl 25 g/l	0,02
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02
T2	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	2,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,0
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,2
	RINPODE	Florpyrauxifen-benzyl 25 g/l	0,02
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02
T3	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	1,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,0
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,2
	RINPODE	Florpyrauxifen-benzyl 25 g/l	0,02
	LENA 500 SC	Lenacil 500 g/l	0,3
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02
T4	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	1,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,0
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,2
	RINPODE	Florpyrauxifen-benzyl 25 g/l	0,02
	LENA 500 SC	Lenacil 500 g/l	0,4
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02

HERBICÍDNE PROGRAMY CUKROVÁ REPA

AM-AGRO 2027

KONVENČNÁ TECHNOLÓGIA

počet aplikácií 4

č. apl.	prípravok	účinná látka	dávka l/ha
T1	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	2,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,0
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,2
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02
T2	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	2,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,0
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,2
	RINPODE	Florpyrauxifen-benzyl 25 g/l	0,026
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02
T3	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	1,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,0
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,2
	RINPODE	Florpyrauxifen-benzyl 25 g/l	0,026
	LENA 500 SC	Lenacil 500 g/l	0,3
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02
T4	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	1,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,0
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,2
	RINPODE	Florpyrauxifen-benzyl 25 g/l	0,026
	LENA 500 SC	Lenacil 500 g/l	0,4
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02

HERBICÍDNE PROGRAMY CUKROVÁ REPA

AM-AGRO 2027 KONVENČNÁ TECHNOLÓGIA

počet aplikácií 3

č. apl.	prípravok	účinná látka	dávka l/ha
T1	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	2,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,5
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,2
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02
T2	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	2,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,5
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,3
	RINPODE	Florpyrauxifen-benzyl 25 g/l	0,04
	LENA 500 SC	Lenacil 500 g/l	0,3
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02
T3	BETASANA SC	Phenmedipham 160 g/l	2,0
	BETTIX 700 SC	Metamitron 700 g/l	1,0
	OBLIX	Ethofumesate 500 g/l	0,3
	RINPODE	Florpyrauxifen-benzyl 25 g/l	0,04
	LENA 500 SC	Lenacil 500 g/l	0,4
	VEXTASIL	Polyéter modifikovaného trisiloxánu 802,4 g/l	0,02

SPEKTRUM ÚČINNOSTI VYBRANÝCH HERBICÍDOV V CUKROVEJ REPE

Burina	BETASANA SC	BETTIX 700 SC	BETTIX COMBI	OBLIX	LENA 500 SC	CLIOPHAR 600 SL	RINPODE
ambrózia palinolistá		x				X	X
bažanka ročná			X	X	x		x
durman obyčajný		X	X	x			X
horčiak obyčajný		X	X	x			
iva voškovníkovitá		x	x			X	x
láskavec ohnutý		x	x	x	x		x
lipkavec obyčajný	x	x	X	X			x
loboda konáristá	X	X	X	x	x		
ľuľok čierny	x	X	X	x		X	
mrlík biely	X	X	X	x	x		X
mrlík hybridný	X	X	X	x	X		x
pichliač obyčajný						X	
podslnečník Theofratov						x	X
pohánkovec ovíjavý	x	x	x	x	x	x	
rumančekovité buriny		X	X		x	X	
stavikrv vtáčí	x	x	X	X			
tetucha kozia		x	x		x	X	X
voškovník obyčajný						x	X
výmrv repky		X	X				
výmrv slnečnice						X	x
zemedym lekársky	x	X	X	x	x		X

X citlivá x stredne citlivá

Leták má informatívny charakter, používajte prípravky na ochranu rastlín vždy v súlade s platnou etiketou.